

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt bzw. von Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, des Apothekers oder des Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

metaheptachol Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird metaheptachol angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann metaheptachol bei chronischen Beschwerden im Leber-Galle-Bereich angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob metaheptachol gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf metaheptachol nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig. Beschwerden bei Kindern unter 12 Jahren müssen ärztlich abgeklärt werden. Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen!

Darf metaheptachol während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie metaheptachol?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, 3mal täglich 25–30 Tropfen in etwas Flüssigkeit vor oder nach den Mahlzeiten einnehmen. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes/Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann metaheptachol haben?

Für metaheptachol sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren. Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie metaheptachol ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Die Tropfen enthalten 34 Vol.-% Alkohol. Bei Zimmertemperatur (15–25 °C) aufbewahren. Vor Kindern geschützt aufbewahren! Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter bezeichneten Datum verwendet werden.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in metaheptachol enthalten?

1 g metaheptachol Tropfen enthält:

Berberis vulgaris D2 100 mg, Chelidonium majus D2 100 mg, Lophophytum leandri D6 30 mg, Quassia amara D2 100 mg, Silybum marianum TM 10 mg.

Das Präparat enthält als Hilfsstoffe gereinigtes Wasser sowie 34 Vol.-% Alkohol.

51'190 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie metaheptachol, welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung. Tropfflasche zu 50 ml und 100 ml.

Zulassungsinhaber: metapharmaka GmbH, 6460 Altdorf/UR

Diese Packungsbeilage wurde im Oktober 2006 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

metaheptachol Gouttes

Médicament homéopathique

Quand metaheptachol est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, metaheptachol peut être utilisé en cas de troubles hépatiques et biliaires chroniques.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si metaheptachol peut être pris simultanément.

Quand metaheptachol ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise. Des troubles chez les enfants moins de 12 ans doivent être clarifiés par le médecin. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne (même en automédication)!

metaheptachol peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser metaheptachol?

Sauf prescription médicale contraire, prendre 25–30 gouttes 3 fois par jour avec un peu de liquide avant ou après les repas. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge/de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires metaheptachol peut-il provoquer?

Jusqu'ici, on n'a jamais observé d'effets indésirables de metaheptachol gouttes quand ce produit est utilisé selon les modalités recommandées. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Lors de la prise de remèdes homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver provisoirement (aggravation initiale). En cas d'aggravation persistante, il faut cesser de prendre metaheptachol gouttes et consulter votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Les gouttes contiennent 34% Vol. d'alcool. Conservez à température ambiante (15–25 °C). Tenez-le hors de portée des enfants! Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient metaheptachol gouttes?

1 g de metaheptachol gouttes contient:

Berberis vulgaris D2 100 mg, Chelidonium majus D2 100 mg, Lophophytum leandri D6 30 mg, Quassia amara D2 100 mg, Silybum marianum TM 10 mg.

Cette préparation contient en outre des excipients tels que l'eau purifié et 34% Vol. d'alcool.

51'190 (Swissmedic)

Où obtenez-vous metaheptachol, quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale. Il existe des flacons compte-gouttes de 50 ml et de 100 ml.

Titulaire de l'autorisation: metapharmaka GmbH, 6460 Altdorf/UR

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic) en octobre 2006.

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo perché contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del suo droghiere, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

metaheptachol

Gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa metaheptachol?

Conformemente ai rimedi omeopatici le gocce metaheptachol si possono usare in caso di disturbi cronici nel campo di fegato e cistifellea.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere metaheptachol.

Quando non si può usare metaheptachol e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Finora non sono note limitazioni d'uso. Non sono necessarie precauzioni particolari a condizione che il preparato sia usato correttamente. Per i dolori dai bambini sotto i 12 anni, bisogna chiedere il consiglio medico. Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, se soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche acquistati di propria iniziativa)!

Si può somministrare il metaheptachol durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino, se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare metaheptachol?

A meno di diverso consiglio del medico, ingerire 3 volte al giorno 25–30 gocce in un pò di liquido dopo pranzo. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se in caso di trattamento di un bambino non si ottiene il miglioramento desiderato, lo faccia visitare da un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere metaheptachol?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di metaheptachol. Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con metaheptachol e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Questo medicamento contiene 34% Vol. di alcool. Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C). Tenere lontano dalla portata dei bambini! Si può usare il medicamento solo fino alla data indicata sulla confezione. Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Che cosa contiene il metaheptachol?

1 g di gocce di metaheptachol contiene:

Berberis vulgaris D2 100 mg, Chelidonium majus D2 100 mg, Lophophytum leandri D6 30 mg, Quassia amara D2 100 mg, Silybum marianum TM 10 mg.

Questo preparato contiene inoltre sostanze ausiliarie come acqua pulita e 34% Vol. di alcool.

51'190 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile metaheptachol, quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica. Flacone da 50 e 100 ml.

Titolare dell'omologazione: metapharmaka GmbH, 6460 Altdorf/UR

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel ottobre 2006 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).